

DE

BLENNORRHOEIS

OCULI HUMANI

COMMENTATIO PATHOLOGICA

QUAM

UT LOCUS IN FACULTATE MEDICA UNIVERSITATIS LITTERA-
RAE FRIDERICAE GUILIELMAE RITE SIBI CONCEDERETUR

SCRIPSIT

J. C. JUENCKEN.

MEDIC. ET CHIR. DOCTOR, PROFESSOR PUBL. ORDIN. IN UNIVERSITATE LITTERARIA
FRIDERICA-GUILIELMA BEROLINENSI, ORDINIS REGIS BELGARUM LEOPOLDINI EQUES,
CLINICI OPHTHALMIATRICI DIRECTOR, NOSOCOMII CARITATIS MEDICUS SUPREMUS,
CONSILII SUMMI EXAMINIBUS MEDICORUM PRAEPOSITI ET COMPLURIUM SOCIETATUM
SODALIS.

BEROLINI MDCCCXXXVII.



INTRODUCTIO.

Morbi contagiosi, si qui, digni sunt in quos omnes animum intendant, cum epidemica propagatione divinam aequae ac humanam naturae nostrae irremediabilem aggressi, nunquam non plus minusve secum ducant detrimenti. Haec novissimis lustris evenerunt momentosa, rem publicam populorum quod secus ac privatam perturbantia morbis modo memoratis stipata sunt, inter quos haud parvas proli dolor egit oculorum labe, quae magistratuum et cujusvis eruditi aequae ac medicorum meditationem ciebat. Quis non meminerit damni, quod hac ratione nostrae plagae exercitus perpassi sunt. Neque ita multum tempus praeterlapsum, cum Russorum milites in Polonia collocati et Belgae tantopere hoc morbo infecti sunt; et fere quotidie observationes instituere licet huc pertinentis miserrimas in orphanotropheis et infantum expositorum hospitibus. At magnus eorum numerus, qui ex parte aut plane lumine hoc malo laborati, vitam degere coacti sunt tristissimam.

Observando hos morbos eorumque naturam indagando omnium et populorum celeberrimi medici studia intenderunt et vires, neque ingignus eorum est numerus qui scriptis rem illustrare nitebantur. Quo-

rum scriptorum meliora in eruditorum medicorum manibus versantur et sufficiat hic mentionem fecisse duorum, quae palmam sibi vinxerunt scripta. dico: J. N. Rust: die aegyptische Augenentzündung unter der Königlich Preussischen Besatzung in Mainz. Berlin, 1820; nec non J. B. Müller: Erfahrungssätze über die contagiöse oder aegyptische Augenentzündung. Mainz, 1821.

Quod autem in horum morborum pathogenia et pathologia, etsi multa nec spernenda elaboraverunt, multa adhuc lateant, et de naturae symptomatibus, causis, propagatione, cura, magna opinionum exstet dissensio, in eo praesertim situm videtur, quod antea hoc morborum genus ab aliis, affinibus, nimis separatum, nec satis dilucidatum est, quibus conditionibus similes aut eadem affectiones et inter privatos appareant iisque foveatur, ut paucis dicam, quod totius morborum, qui oculos affectant, ordinis pathologiam, pathogeniam, aetiologiam et therapiam accuratius inquirere et indagare plane neglectum est.

Indulgentiam artis confessorum in dijudicando, mihi non defuturam sperans, tale quid suscepi. Literis tradidi, quod experientia, assidua ingenuaque morborum diversissimis formis praedictorum investigatio me docuerunt. Iam ab anno MDCCCXV momentosissimas oculorum epidemias in Germania grassantes observavi, et munus, quo fungor, ansam mihi praebet, oculis laborantium copiam quotidie visendi opportunissimam.

DE BLENNORRHOEARUM OCULI NOTIONE.

oculi conjunctiva, serosae membranae natura deposita, mucosae subiit
nam et vices, blennorrhoea constituitur. Structura igitur conjunctivae et functio
e malo ingresso alienantur, et in sano statu pulcherrima visus, semipellucida,
quibus vasculis disperse impleta, albido colore splendens, nunc opaca, crassior
scarlatinae rubore tincta apparet. Papillae, mucosis membranis propriae,
magna copia eam oppleunt, unde modo holosericum intonsum, modo vulnus gra-
datione obtectum, modo ova piscina imitatur, et genuinum mucum demittit.
accipua hinc inde exoritur blennorrhoeas inter et ophthalmias differentia. In-
unmato enim oculo conjunctiva glabram nunquam amittit superficiem et splen-
dorem, immutata manet structura, rubor vasis sanguine nimis repletis, sat per-
icuis originem debet, et pituitam, quam secretam reperimus, Maibomianae glan-
dae et cryptae sabaeae largiuntur, quae frequenti numero palpebras, ubi ad
esum vergunt, interne cingunt et externe. Papillae in conjunctiva formatae,
ceus ex iis secretus, signa exhibent blennorrhoeis propria et pathognomonica.

Quodsi vero inflammationis signa in blennorrhoearum decursu occurrunt, in-
cremento earum et decremento obsequuntur, immo haud raro plane evanescent,
orbo primario adhuc florente. Hic enim organica mutatione, qua papillatum
ppus in conjunctiva gignitur nisus, usque dum illud conspiciatur, perdurat, nec
us ab eo liber habendus oculus, quam conjunctiva, peculiari structura recupe-
ra, glabram offerat et splendentem superficiem. Plerumque quidem blennor-
hoeae inflammatoriis signis stipantur, nec raro exitum formant ophthalmiae.

Eae praesertim oculorum inflammationes, quae conjunctivam, ac si mucosa esset, ingrediuntur, si quam reppererunt proclivitatem in aegroto et opportunitatem, in blennorrhoeas transire possunt. Quodsi accidit, incipiente profluvio inflammatoria signa perdurant, saepe etiam angentur, quod non raro perduxit medicos, ut blennorrhoeam non differre putarent ab ophthalmia, unde orta erat, ejusque secundum eundem stadium esse contenderent. Hi tamen exitum morbi cum morbo ipso causam cum effectu confundentes, idem fecerunt, quod antiqui temporis medici, qui abscessum inflammatorium, et indurationem benignam inflammationis stadium haberent, quod utrumque, ex inflammatione origine sumta, inflammatoriis signis stiparetur. Attamen obsoleta haec et inveterata, nec difficile est, eadem ratione omnes organicas mutationes in inflammationibus numerare, quod pleraeque, exceptis pseudorganisationibus, inflammationis signis comitantur.

Si ceterae, quae in corpore exstant, membranae mucosae, affectae sunt, jam satis accurate ab inflammatione dignoscitur, blennorrhoea, ut quoque hanc illa progenuerit. Quonam jure ergo dubitamus, idem in conjunctivae affectione conferre? Ut enim ad pulmonum catarrhum phthisis pituitosa, sic etiam ad catarrhalem ophthalmiam, quae successit blennorrhoea referenda. Pulmonum blennorrhoea saepe catarrhum insequitur, nec raro symptomata huic propria initium blennorrhoeae perdurant, saepe etiam increscunt; attamen medicus in magnum incideret errorem, qui phthisin pituitosam catarrhi secundum stadium inncuparet. Est novus plane et integer morbus blennorrhoea, et symptomata ei conjuncta inflammatoria, haud raro tolluntur, affectione ipsa indiem crescente. Non minus peculiare et proprium morborum genus formant oculorum blennorrhoeae, et a ophthalmiis eodem jure separandae sunt, quo jam dudum alia profluvia ab inflammationibus dignoscuntur. Natura, symptomatibus, decursu, causis et sequelis magna earum exstat cum phthisi pituitosa, gonorrhoea aliisque blennorrhoeis similitudo.

DE SEDE BLENNORRHOEARUM OCULI.

Ut ceterae blennorrhoeae, et quae oculis propriae sunt, mucosas occupant membranas. Inhaerent enim aut mucosae sacci lacrimalis aut conjunctivae. Conjunctiva potissimum ingravatur, ita ut, si de blennorrhoea sermo fit, conjunctivae affectionem omnes intelligant nisi insuper forte addatur, rarius et minus sive sacci lacrimalis malum accipiendum esse. Vicinae etiam mucosarum partium, immo internae oculi, exstante blennorrhoea, corripì possunt unde magis mihi sive infestari videmus aegrotantes. Differunt haec secundum causas, complicationes, laborantium naturam et opportunitatem, inflammationis denique quae morbum stipat, vehementiam. Sic in sacci lacrimalis blennorrhoea, modo sola mucosa, modo cellulosa et adiacens periosteum, nec minus si conjunctiva in hunc locum incidat, modo ipsa tantum, modo cellulosa, sclerotica, membrana nunc scemctii, modo, quod raro quidem accidit iris et ciliare corpus simul corripuntur. Hic de conjunctivae tantum blennorrhoeis sermo fiet.

DE OCULI BLENNORRHOEARUM SYMPTOMATOLOGIA.

Symptomata blennorrhoeis propria magnam in partibus correptis adesse turbationem satis ostendunt. Sanguis celeriori cursu ad ocnlum propellitur, et tantus plerumque vitalium functionum motus, ut simul etiam signa, quae inflammationem manifestant, non desiderentur. Exstant tamen blennorrhoeae, nullis certe exiguis inflammatoriis signis stipatae, quales saepius observantur, quae cum lacrimalem, rarius quae conjunctivam obtinent. Quod autem maxime dignit ophthalmoblennorrhoeas, in nimia pituitae secretionem quaerendum est, quae collatis ceteris symptomatibus ita praevallet, ut non ex naturali quodam reitorio organo, glandulis Maibomianis aut cryptis sebaecis, sed ex plane novo

fonte eam effundi, quisque statim intelligere possit. Pituita modo limpida est aquosa, lae rimis mixta, quae inde lae imitantur, tenues flocculos continentes modo crassa, tenax, flava, puris formam et qualitates adaequans, modo livida iehori simili, ingenti copia profluens. Semper ex oculo ipso scaturit, et facile nobis persuadere possumus, palpebrarum margines eam non largiri. Acrem corrodentem exserens vim, praesertim si iehoris aut puris offert consistentiam e colorem, ubi diutius inbaesit, et cuticulam destruit, ulcerum provocat periculum. Sin vero incrassata genuini muci colorem induit et naturam, si lacrima multa mista, tenuatur, corrodentem vim amittit et mitior evadit.

Momentosissimum autem et vere pathognomonicum signum, palpebris ex trorsum versis, reperitur. Conjunctiva enim papillis mucosis, pituitam denittentibus conferta est, quae primo in plicis ejus, ubi ad bulbum transit a palpebris exortae, palpebras protinus occupant. In vehementioribus tantum blennorrhoeae etiam in bulbo conspiciuntur, immo si summum gradum attigit morbus, in cornea conjunctiva progigni possunt. Decrescente morbo, inversam ingrediuntur viam et ubi primo apparuerant, longissime inhaerent. Constant ex parvis, rotundis carunculis; vulnorum suppurantium granulis haud dissimilibus, quae formam et naturam secundum aegroti opportunitatem, aliasque causas varie mutantes, modo sammetum intonsum, modo ova piscina, modo materiam rother Chagrin nominantur, modo vesiculas pallido-rubras et mucosas ulcerum granulationes imitantur, modo majores e fusco rubras semisphaeras, ut cariosorum ulcerum granulationes observare licet, constituunt; interdum etiam sarcomatosis ulceribus haud multum differunt.

Ubi primae provenerant papillae sanguine venae implentur et scatent, raro varicosae factae in orificiis papillas ostendunt. Initio series quaedam papillarum solitaria, in ipsis conjunctivae plicis sese offert, tantummodo palpebris accurate elatis conspicienda. Simulac increscere coepit papillarum numerus et vigor, absconditis vasis, tumescit conjunctiva et incrassatur, venae autem in cunctis sitae sanguine confertae prominent, nec minus palpebrarum et faciae

nae majorem ambitum et turgorem plerumque acquirunt. Hae in conjunctivae palpebrarum venis observata sanguinis abundantia, corporis papillati formatione antecedens, ejusque decursum concomitans in blennorrhoearum pathologia therapia valde respicienda est, non prius enim papillae recedunt, quam ista evanuerit.

Ex his ergo modo descriptis papillis, morbosa pituitae secretio originem habet. Palpebra enim sublata, ipsas papillas secreto obtectas conspiciamus, quod cum penicillo caute remotum, denno statim seaturit, ut microscopio adhibito, saepe oculis non armatis observare licet. Papillae cum cryptis sebaceis confundendae sunt, quae intra conjunctivam et internum cartilaginis tarsalis marginem magna copia sitae, saepe jam in ophthalmiis catarrhalibus, semper blennorrhoearum initio, oribus infaretis et secreto stagnante ita intumescunt ut graecorum e rubro flavorum instar supra tarsum in interna palpebrarum superficie appareant, immutata conjunctiva obtectae. Si blennorrhoea adest, hinc nil sequitur, donec inflammatoria signa evanuerint; tum vero mitis et benigna prodest pituita. Toto oculo ab his distant papillae mucosae, quae a conjunctivae initio sumto protinus eam occupant, et ut bene dignoscatur et curetur blennorrhoea, a cryptis infaretis accurate discernendae sunt. Hae etiam in sano oculo non raro observatae, ad catarrhales ophthalmias proclivitatem adesse insinuant; illae vero aegrotare oculum manifestant, ut quoque omnia cetera symptomata desint. Valde erraret medicens, qui ita mutatis oculis nil damni imminere crederet; dum illae perdurant, morbus non finitus habendus, et sub cinere pruna latissina causa denuo provocatur. Nunquam igitur oculi ob blennorrhoeae suspicionem inquirantur, quin conjunctiva ad plieas usque evoluta sit, quod in utraque palpebra, facile in inferiore paullo difficilius in superiore perficere licet. Quo minus inflammationis signa, conjunctivae et partium vicinarum tumor pollent, eo valentius papillae prominent; sin vero blennorrhoea vehementiori inflammatione initio stipata erat, antequam cellulosae tumor recesserit, non satis perspicue fiunt.

Quo magis papillae efferuntur, eò magis conjunctiva et palpebrae intumescunt, et cum in conjunctivae plicis metamorphosis maxime excolatur, pars li respondens externa prae ceteris clata apparet. Tumor symptomaticae inflammationi succedens, prope margines palpebrarum summum ambitum acquirit.

Modo descriptis phaenomenis magna photophobia et omnia inflammationis propria symptomata, dolores, rubor, tumor, calor adauctus, functio partium affectarum laesa, immo febris acrior plerumque accedunt.

Photophobia in acutis blennorrhoeis vehementissima, neque in chronicis plane desiderata, et in ophthalmiis observatam antecellens, simul cum ceteris morbi symptomatibus commutatur, et increscit, ita ut minimum lucis radium intolerandum repudiet aegrotus.

Dolores vehementes plerumque et in acutis blennorrhoeis saepe vix tolerandi, secundum diversas partes, quae simul correptae sunt, et complicatione naturam variant. Summum acumen appetunt, si statim ab initio organa oculi fibrosa laboraverunt. Pungentes, prementes, ardentes, et cum sensu, quam aliter num in oculo versans corpus avenae granella aliudve excitare solent adjacentes quoque partes, supracilia et frontem infestant, immo, crescente morbo, orbita et totum caput ad occiput usque occupare possunt.

Tumor, major in acutis quam in chronicis blennorrhoeis, palpebram superiorem praesertim sibi eligit sedem, nec raro ita commutat, ut rubrae, nitidis semisphaerae instar, immobilis bulbum saepe etiam inferiorem palpebram tegat et plane abscondat. In teneris et irritabili cute praeditis aegrotis, circum intumefactas palpebras nonnunquam rubor et oedema apparent, unde oculum circuitum in erysipelas incidisse facile credi possit. Usque dum creseat blennorrhoea et augeatur, tumefactae palpebrae cutis tensa, glabra peculiarem nitorem spargit; decrescente morbo, rugosa fit, et si valde tensa fuerat, furfuris inspicitur, et cuticula deglubitur. In chronicis blennorrhoeis, modica ut plurimum et modesta est intumescencia. Causae tumoris in papillati corporis formatione, magna venarum oppletionem, et concomitante inflammatione sitae sunt.

Rubor in fuseum vergens, venis nimis impletis plerumque originem debet, versus palpebras violaceus imino ceruleus conspicitur.

Celeri et vehementiori blennorrhoearum decursu, calor valde adangetur, simul cum ejus incremento, minimum tactum oculi indolescunt.

Febris sub vespere aucta, saepe etiam deliriis stipata, mane remittens graviori blennorrhoea non desideratur.

Ex omnibus modo descriptis symptomatibus, sat perspicuum erit, blennorrhoeas longe graviori perturbatione organica niti, quam ophthalmias, nec mirandum idcirco, illas etiam majoris momenti mutationes in oculo subsequi, quae tanto impetu interdum invehuntur, ut uno die et celerius oculus e fundo destruat.

Ut vero blennorrhoearum naturam et facultates altius perspicere possimus, eorum gradus accurate respiciendi sunt, quorum tres secundum majorem vel minorem morbi vehementiam, discernere licet. His tanta symptomatum inest varietas, ut non satis eruditus, morbum, si secundum vel tertium gradum assecuta est, novum et plane alium, quam in primo stadio versantem cognoverat, habere possit. Differentiae ex varia secreti natura procedunt.

Primum stadium hydorrhoeae (ab ὕδωρ aqua et ῥοή profluvium) nomen accepit, et lacrimae turbidae, lacteae, acris, limpidis flocculis mixtae periodico fluxu insignitum est.

Secundo stadio copiosior fit secretio, et quod effluit mucosum e limpidiorum, recentis albuminis induit formam, unde phlegmorrhoeae (a φλεγμα, plicua) nomen exortum.

Si tertium stadium blennorrhoea assecuta est, frequentissimum fit secretum, pus colore et consistentia imitans, nec inepta hinc pyorrhoeae (a πυῶς pus) denominatio.

Dum intra primi stadii limites morbus versatur, magnam cum catarrhali ophthalmia habet similitudinem, ita ut peritus tantum medicus utramque affectionem recte dignoscere possit primo intuitu.

Sub vespere plerumque initium statuunt blennorrhoeae, rubore e pallido

in flavum vergente albugineam tingentes. Aegrotus pressionis sensum et aenam in oculis adesse conquerens, lucemque evitans, oculos turbidos, quasi aqua nantes ostendit. Tetra lactea, acris, limpidis pituitae floccis mista crima oculo nasoque subinde effluit, unde frequens sternutatio exoritur. Non in angulis oculorum et intra cilia cumulata pituita palpebras conglutinat, quae mane tepida lotionem cum magno aegroti levamine et ceterorum symptomatum missione removetur. Cum alio vero et graviore, quam ophthalmia catarrhica est, morbo rem esse, ex photophobiae et dolorum vehementia, nec minus ex more, et acriore lacrimarum, flocculis mucosis turbata qualitate, prae ceteris item ex papillari corpore in conjunctiva orto medicus mox intelliget. Tum primo tarsalem margineum palpebrarum occupans, circumscriptus, nitens, e fovea ruber, non multo post, versus orbitam propagatur. Lassitudo et gravedinis sensus palpebram superiorem obrepat, ita ut vix eam tollere possit aegrotus, rimam palpebrarum minor appareat. Turbido secreto etiam visus perturbatur, immo si corneae flocculi inhaerent, subinde plane caligat et aegrotus de videre imbecillitate existant quaerelae. Cornea hoc stadio non corripitur, sed limpa remanet et splendens. Varium tempus hic blephorrhoeae gradus durat, et nunquam alii cedit, modo rapide in alia stadia transit, ita ut morbus, initio observato, interdum jam in secundum stadium transgressus sit, cum aegrotus medicum adit.

Si in secundum stadium, phlegmorrhoeae, blephorrhoea conversa omnia symptomata increseunt, nec facile aliquis peculiarem mali naturam intelligat. Jam primo ejus initio res plane alias fieri videmus. Secretum coctius, turbidum et tenax fit, palpebrae toto ambitu intumescunt, rubent, tenduntur et proprium nitorem spargunt, superior inferiorem plane abscondit et aegrotus vix et ne vix quidem aperiri potest. Una cum tumore photophobia augetur, dolores ad imam orbitam penetrantes, capitis etiam partem occupant. Pituita ex oculo scaturiens, flava, in ciliis, angulis et externa palpebrarum superficie haerens in flavas crustas commutatur, quae matutino tempore rimam oculorum

agglutinata offerunt. Cum nimis crassum sit et tenax secretum, ad nasum demittitur, ideoque catarrhi symptomata, imprimis sternutatio desinunt. Si certius palpebram, quod non nisi dolore vehementer aucto fieri potest, papillae corpus jam totam palpebralem conjunctivam occupare videmus. Scleroticae conjunctiva vasis turgentibus et sanguine confertissimis rubefacta apparet.

Si blennorrhoeae acute et cum vehementia decurrunt, non multo postquam stadium intravit, conjunctiva tumet, et ad vallum instar circa corneam effertur, ita ut haec, si ad tertium stadium morbus vergit, in infundibulo, pituita operculo sita appareat. Hae intumescunt, sero in cellulosa, conjunctivam inter et scleroticam positam, effuso, exorta in iis blennorrhoeis celerius formatur, ubi ab initio cellulosa et sclerotica simul aegrotaverant.

Dolores idies crescant, et pungentes, ardentes cum pressionis sensu coniecti, in orbitam supraeilium et adjacentem capitis partem progrediuntur, et sub oppore exacerbat, mane se remittunt. Irritabiles aegroti jam hoc stadio plerumque in febrem incidunt.

Altero tantum oculo aegrotante, alter consensu laborat et lucem fugit.

Cornea, intrante secundo stadio, nitore deposito, turbida, tanquam inflata apparet; et praesertim cum chemosis exorta est, ad margines nubila, in superius scabra et corrosa conspiciuntur, nec multum tempus necessarium, ad pathognomonica illa ulcera provocanda, quae corneam caustiei instar destruunt.

In adolescentulis et sanguine pollentibus aegrotis, si rapide decurrit blennorrhoea, symptoma hoc stadio saepe occurrit, quod aegrum, affines nec satis peritum medicum magno metu compellit; repentinum dico sanguinis rubri ex oculo fluxum. Hic, exstante nulla externa causa, nimis impleto vasculo rupto exoritur, plane innoxius ut plurimum symptomatum remissionem secum ducit, non aliud praesens ac localis arte provocata sanguinis missio.

Etiā hoc stadium, secundum mali naturam vehementiam, causas et in quo sitam opportunitatem varium tempus perdurat. Semper tamen haec ratione num antecellit, nec raro per hebdomades et menses aegrotum vexat. Utplu-

rimum blennorrhoeae hunc gradum non excedunt, et quin tertium et vehementissimum assecutae sint, tolluntur.

Si ad hunc pervenit morbus, quod rarius quidem accidit, omnia symptomata summum acumen ascendunt. Palpebra superior ita intumescit ut immobilis inferiorem obtegens, non raro juglandis et majorem ambitum acquirat. Cutis ejus glabra, splendens, tensa et rubre tincta apparet. Raro oculum aperire et corneam inspicere licet. Photophobia, etsi aeger oculum aperire nequeat, ingens fit, dolores fere intolerabiles, orbitae, capiti immo occipiti inhaerentes corpus et animus simul vehementissime vexant. Debiles et irritabiles aegroti graviori syncope corripiuntur.

Nunc et in sclerotica, saepe etiam in cornea formantur papillae, secretum emittentes, puri simillimum, tenax flavum, parce destillans, quod superioris palpebrae tumore retinetur, copiosissime profluens, simulac inferior paullulum tracta est. Caustici instar externam palpebrae inferioris superficiem corrodit et inflammat. In palpebrarum marginibus et oculorum angulis inhaerens crustas fusco flavas conformat, quae magno numero ibi reperiuntur.

Si initio hujus stadii oculum aperire contingat, corneam turbidam partim ulceribus obtectam, partim elatam videbimus. Scleroticae conjunctiva, chemosis antea intumefacta et vallum fere circa corneam formans, nunc granulationes fert, quae celerrime crescentes corneam cingunt et secreti effluvium retinent. Hoc acumine blennorrhoeae longius raro persistunt, sive enim ad mitiorem gradum recedunt, sive cornea perforata internarum partium prolapsum et oculi irritum provocant.

Pessimi ominis symptoma habendum, si inopinate fluidum sero sanguine simile ex oculo scaturit, quod non confundendum est cum innoxia illa antecedenti stadio interdum observata haemorrhagia. Si hoc fluidum accuratius investigaverimus, lentem et corporis vitrei partem saepe in eo absconditam reperiemus aegroti imminente hoc symptomate, sensus obrepit, ac si in ipso oculo quid tum sit. Remissio morbi et hinc sequitur, oculus vero e fundo destructus,

am restitui potest. Exoritur enim hoc profluvium, simulac ulcera corneam metrarunt et interna oculi prolabuntur.

Primo stadio et secundi initio praeter pathognomonica signa, alia occurrunt quae variis causis orta, formam morbi commutant et propriam reddunt. Illi modo inter aegyptiacam, gonorrhoeicam, serophulosam, catarrhalem et arthriticam blennorrhoeam discernere licet. Simulac vero in tertium stadium morbus vergit, et magis etiam ipso jam constituto, omni specifico absterso, pathognomonica blennorrhoeae signa ita praevalent, ut omnes ex causis occasionalibus differentiae evanescent, ideoque morbus, ubi summum attingit, variarum species, ne dicam similia, plane eadem offerat symptomata, nec visu medicus cognoscere possit, num ab initio gonorrhoeica, aegyptiaca an catarrhalis fuerit blennorrhoea.

Remittente morbo symptomata, via qua progressa erant, inversa recedunt, ut ex pyorrhoea, phlegmatorrhoea et hinc hydorrhoea evadat. Quae blennorrhoeae acumen ascenderant, antequam plane tollantur, diu hydorrhoeam secum ferunt.

DE OCULI BLENNORRHOEARUM DIFFERENTIIS.

Valde erraret, qui omnibus blennorrhoeis symptomata communia esse putaret aequae vehementia et sibi congrua. Secundum enim originem, causas, commutationes, aegroti constitutionem, aetatem, alia, varias inducere possunt formas.

Secundum originem primarias inter et secundarias blennorrhoeas distinguendum. Primariae vocantur, quae alia affectione non antegressa, statim ab initio, peculiari conjunctivae metamorphosi orta, pituitam ex oculo demittunt, ita simulac dolorem et photophobiam aegrotus percepit, palpebris inversis in conjunctivae plicis papillatum corpus conspiciatur, quocum inflammatoria signa non recedunt. Gonorrhoeica, aegyptiaca, neonatorum, omnes omnino blennorrhoeae, contagio ortae, in his numerandae sunt.

Sin vero modo diutius modo per brevius temporis spatium antegressa inflammatio in blennorrhoeam exitum sumpsit, haec secundaria nuncupatur. Omnes ophthalmiae, quae conjunctivam, tanquam mucosam, ingrediuntur, aegroti opprobrio, aut aliis causis, in blennorrhoeam transire possunt, ita ut blennorrhoeae catarrhales, catarrhales rheumaticae, serophulosae et arthriticae in ejusdem fontem ophthalmiis quaerant. In his casibus, blennorrhoea malum ex inflammatione progressum deuteropathicum format; nihilominus tamen etiamnum ingens et plane novus est morbus, qui eadem ratione, qua abscessus inflammatorius et induratio benigna, ab inflammatione distat, etsi saepe ad finem usque inflammatoriis signis indiem crescentibus stipatur.

Alia nec exigua differentia ex organi aegrotantis vigore blennorrhoea existit unde synochalem, crethicum et torpidum characterem induere possit. Synochales rarius et in robustis tantum hominibus, mediae aetatis observantur, plane sibi congrua ostendunt symptomata. Una cum pituitae secretionem et lacrimarum formationem inflammatio incedit, palpebrae, rubre tineta, nitenti, glabra et tensa superficie, tument, et velox rapidusque decursus, vitales functiones valde adauctas documentat. Primariae blennorrhoeae, si, quod plerumque fit, huiusmodi induerant characterem, initio aptis remediis celeriter adhibitis facile discedunt, neglectis oculum celerrime destruunt.

Longe frequentior crethica blennorrhoearum est indoles, quae magna ceteris symptomatibus incongrua doloris exacerbatione, photophobia et per se et corrode secrete insignita, in imbecillis, dyscraticis et cachecticis hominibus praesertim occurrens, lentum morbi decursum et in ulcerationem exitum facile provocat.

Torpidum characterem omnes fere blennorrhoeae induunt, in chronico statum conversae. In his dolores, cum ceteris symptomatibus collati exigui, pituitae vero secretio copiosissima, rubor fuscus, venosus, tumor magnus et palpebrarum numerus frequentissimus observantur. Lente ut plurimum decurrunt, magna pertinacia remediis resistunt.

Temporis ratione blennorrhoeae in acutas et chronicas dividuntur. Acutae, vehementem, pathognomonicis morbi ipsius symptomatibus congruam inflammationem offerunt, et interdum tanta atrocitate decurrunt, ut intra diem et celerius bello interitum parent. Plerumque autem usque ad perfectam resolutionem aut sex hebdomadum spatium emetiuntur.

Quae hoc tempus excedunt, chronicae appellantur. Omnibus blennorrhoeis aeterna in chronicum statum transeundi insita est, proclivitas, quae partim causis recurrentibus, partim correptarum partium natura exponenda praesertim in hominibus ad profluvia mucosa constitutione aut praedispositione proclivis observatur. Rapidae aut majorem gradum assecutae blennorrhoeae facile chronicae fiunt, longiores, annos immo per totam vitam durare possunt.

Propagationis gradus inter blepharo et ophthalmoblennorrhoeas differentiam constituit. Blepharoblennorrhoeae palpebrarum tantum conjunctivam papillis et scleroticam conjunctivam inflammata, cetera symptomata mitiora offerunt.

In Ophthalmoblennorrhoeis bulbi et saepe etiam corneae conjunctiva in ulcerem illam metamorphosin incidit, unde phaenomena vehementissima oriuntur.

Conjunctivae blennorrhoeis, tanquam externis, nonnulli internas opposuerunt, quod interdum papillare corpus in ipsa orbita reppererant. Ad hoc tantum plane destructo et pessundato, verisque granulationibus in orbita ortis obstat. Primariae blennorrhoeae internae non occurrunt.

Quae jam sequitur blennorrhoearum divisio inter momentosissimas numerum nec minus ad bene dignoscenda symptomata et sequelas, quam ad aptum curandi methodum instituendam necessaria. Secundum enim causas et organa recepta simplices a complicatis separantur.

Ad simplices pertinent blennorrhoeae, ex simplici causa exortae, quae ab conjunctivae tantum inhaerentes, priusquam majorem vehementiam assecuerint, vicinia non corripunt. Tum vero, cellulosa, sclerotica, immo interne serosae membranae, tunica Descemetii et capsula lentis in inflammationem et exudationem incidere, et omnium symptomatum incrementum oriri potest.

Tali modo neonatorum blennorrhoeae non raro catarractam centalem succedunt vidimus.

Non omnes autem blennorrhoeae simplici causa nituntur; saepe plures simul morbi originem sibi arrogant. Sic contagium refrigerio, hoc metastasi scrophulosae, catarrhus rheumatismo aut gastricis perturbationibus conjungi possunt nec desiderantur syphilis, scabies, herpes, arthritis scorbutus, saepe etiam peculiaris quaedam diutius aegrotum obtinens proclivitas. Omnia haec morbi decursum, exitum, sequelas, propagationem in vicinas partes, et vehementiam vari commutant. Secundum causas occasionales et praedisponentes una cum conjunctiva modo cellulosa, modo sclerotica, modo internis serosis membranis connectis, jam a blennorrhoeae initio saepe scleritis et hydromeningitis simul servantur. Hae blennorrhoeae complicatae nominandae sunt, et majori violentia quam simplices incedentes, phlyctenae, abscessibus in cornea, immo et oculi secretionem ex ipsa orbita provocatis celeri impetu oculo interitum parare possunt.

Si cum gastricis perturbationibus blennorrhoeae conjunguntur, ut plurimum phlyctenae ad corneae marginem apparent, quae alias plane innoxiae leniter ruptae et in ulcera aphthis similia commutatae, secreti acrimonia corneam mox plane destruunt. In neonatorum blennorrhoeae aphthae haud raro occurrunt, quae cuique curandi methodo adversae, aegrotulos oculorum lumine privant.

Non minus periculosam complicationem blennorrhoearum, rheumatismus format, qui scleroticae et saepe etiam membranae Descemetii inhaerens oculi symptomata graviora et decursum rapidiorem reddit. Dolores rheumatici initio blennorrhoeae per tendinosa et fibrosa orbitae organa ad occiput non penetrant, quod alias tantum si summam gradum attigerant blennorrhoeae, solet. Mox tenuis rubor circa corneae marginem apparet, iris immobilis statim pupilla coarctatur, camera oculi anterior magna et humore aqueo impleta, posterior corneae superficies tanquam inflata et turbida conspiciuntur. Non u-

est cornea primo sub punctulorum turbidorum tum flavescentium tumorum forma acceditur, qui sponte aperti et acri secreto blennorrhoeico in ampla ulcera con-
 gesi corneam mox plane deterere solent. Metastasi rheumatica exorta nonnun-
 quam hypopium apparet, unde introrsum etiam summum periculum oculo im-
 pact.

Inter pessimas et laetor dictu rarissimas complicationes blennorrhoearum
 erbutus numerandus. Hic secretum ichori simile et livido sanguine mistum
 agiens et fusco et venoso rubore oculum tingens ad ulcera in cornea provo-
 cata putrida valde inclinatur, et ut plurimum lumina penitus destruit.

Si syphilis cum blennorrhoea conjuncta apparet, iris et ciliare corpus si-
 mil corripiuntur. Ulcera sypiliticis simillima, perfossa cornea, oculum pessun-
 dat. Dolores terentes, vehementissimi orbitae et ossi frontis inhaerentes, ver-
 median noctem aemen assecuti, mane remittuntur.

In arthriticis blennorrhoeis jam ab initio, tendinosae, fibrosae et serosae
 ali partes simul laborant. Dolores terentes aeris et temperaturae mutationes
 quuntur. Cornea mox in ulcerationem incidit.

DE OCULI BLENNORRHOEARUM AETIOLOGIA.

Causae blennorrhoearum in praedisponentes et occasionales dividuntur.
 mas agunt praedisponentes, quo enim pertinacius in oculum invehuntur, hic
 proclivior factus minime irritamento morbo succumbit. Praecipuam ad blen-
 rhoeas opportunitatem scrophulosis provocat, quae cum totum corpus tum im-
 mis oculos omnibus noxis externis exponet, et membranas mucosas peculiari
 dam afficit irritabilitate. Non minus momentosa ad blennorrhoeas exstat
 edispositio in iis hominibus qui venas omnino, et imprimis oculorum, sanguine
 fertissimas gerunt et exultas, major etiam in iis quibus perpetuo et magna
 ia versus oculos mittitur sanguis.

Ut omnino in serophulosi laborantibus profluvia mucosa occurrunt, ita blennorrhoeas oculorum optimum in his reperire pabulum, in orphanotropheis versati, facile nobis persaudere possumus. Gravissimas formas ejusmodi blennorrhoeae induunt et symptomatum vehementia et decursus velocitate omnino antecellunt.

Congestiones versus caput et oculos diutius durantes, maxime blennorrhoeis favent. Perinde habetur, quibus causis nitantur, num atmosphaerae, virtus et vestimentorum ratione, an inclinatione ad alios morbos, num passivae sunt an activae; simulac venae in conjunctiva iis nimis excultae sunt, ad blennorrhoeas oculi opportuni habendi.

Quantopere clima conferat ad blennorrhoeas citandas, in aridis terris conservare licet, quae hos morbos inter endemios et stationarios numerant. toto Oriente, Tauriae litoribus, imo in Hispania meridionali, Calabria, Sicilia et Lusitania ingens eorum numerus, qui blennorrhoeis oculorum lumine orbati sunt. His hominibus sanguis tanta copia versus caput et oculos propellitur, ut omnia capitis vasa eo seateant, et oculi rubieundi conspiciantur; nec inusitamine iis venit remedium; testante enim viro A. Ehrenberg in Arabia et Numidia apud ejusmodi aegrotos scarificationes institui solent in fronte, unde tam copiose profluat sanguis, ut vix sistendus non raro deliquia cieat.

Victus etiam ratio, quae congestionibus versus caput et oculos favet, blennorrhoeas proclivos reddit homines. Ideo, qui ad Rhenum habitant Noricae planitiem incolunt saepe corripuntur. Illi vino dediti et ciborum nutritientium usui, venas valde excultas gerunt, unde conjunctiva rubra et oculi sanguine oppleti reperiuntur; inter hos spiritus adusti abusus easdem causas efficit, quae utriusque populi omnes ordines toties in blennorrhoeas prorumpunt.

Non raro etiam congestiones, ad alios morbos in corpore exstante provocatae et cultae, blennorrhoearum causam praedisponentem largiuntur. Huc pertinent complures morbi inter privatos nostros et artifices hic observati, qui plethorae abdominali originem debent. Quales sunt apud vi-

gnationes in vena portarum, et haemorrhoides, apud mulieres mensium per-
bationes. Si hinc inde ad oculos congestiones exortae sunt, ad blennorrhoeam
stituendam exigua tantum causa occasionalis neccessaria est et saepe jam ca-
rrhus conjunctivae neglectus sufficit. Cum vero artifices et omnes ad officia
venda totum per diem sedere coacti, persaepe abdomine laborent, iisque oculi
his abdominalibus scateant, non mirum, quod saepius blennorrhoeis suc-
cumbant.

Mancam et corpus vasaque ad collum sita majora nimis coarctantem ves-
tendi rationem, congestionibus ad caput et oculos provocatis, blennorrhoearum
gigni valde favere milites nos docent, qui collo fere compresso incedere coacti
sunt. In his conjunctivae vasa non minus quam in Arabiae et Numidia incolis,
formata sese offerunt *).

Praeter descriptas noxas, quidquid oculis irritamentum affert, sive extror-
na accedit sive interne gignitur, blennorrhoeis opportunos reddere potest homi-
ni. Lucis radii nimis acres, sordes, vapores, arena, fumus, alia aeri immixta,
diutius oculos infestaverant, blennorrhoeis exponunt. Sic in parturientium,
tantum inventorum hospitibus et pauperum domiciliis per hiemem ubi abhominum
et aere pessimo impleta sunt, neonatorum blennorrhoeam longe frequen-
ter observare licet quam per aestatem.

At longe maximam viam ad blennorrhoeis viam muniendum cujusvis gene-
ophthalmiae exerceant et exigua tantum occasionalis causa expostulatur, ut
isti morbi succedant. Hoc praesertim tempore experimur, quo blennorrhoeae
hemice grassantur, tum enim oculi irritati, rubri, leni catarrho laborantes ce-
citudo corripuntur.

Etiam cutis functione, immunditie, refrigerio, exanthematibus repulsis, pe-
na sudore sublato, aliisque rebus, turbata, oculi facilius in blennorrhoeam in-
cumbant.

*) Evolveas libri quem conscripsi de ocul. morbis pag. 28. (Secundae editionis.)

Aeris atmosphaerici et climatis mutationes hic non omittendae sunt. U enim celeri cursu temperatura variatur, profluvia omnino et praesertim oculorum magis aluntur quam hilari et constanti aeris statu.

Sunt quoque, qui sani et nil laborantes, peculiarem offerant ad blennorrhoeas dispositionem. In his conjunctiva facilius irritanda in culpa esse videtur.

Nihil tamen in oculo ipso tantam ad blennorrhoeas relinquit proclivitate quam ipsa blennorrhoea. Ut etiam haec optime curata sit, mensibus et annis praeterlapsis exigua causa citata redit, praesertim si granulationes vel minime in conjunctivae plicis remanserant.

Occasionales oculi blennorrhoearum causae cum, ceteris profluviis, propriis complura communia habent, eoque celerius morbum eient, quo magis praedispositio antea exulta est.

Refrigerium omnibus blennorrhoeis causam occasionalem sat frequenter exhibet. Sic in pulmonum blennorrhoeis saepe accusandum est, potissimum una cum mucosa etiam fibrosas et serosas in pectore sitas membranas aggressas bronchiorum mucosam ad morbum proclivam reperit. Tum repente nec opinatus saepe oritur morbus, dummodo mucosis congestione versus pectus irritatis, troitus ei facilius, reddatur.

Non minus oculorum blennorrhoeae refrigerio saepissime originem debent exstante quadam dispositione, et vehementius etiam incedunt, fibrosis et serosis organis eadem noxa correptis. Frequentissimam nec satis respiciendam neque oculorum ophthalmiae causam in refrigerio durante aut modo finito partem exortum querere oportet.

Refrigerationes a pauperrimis Orientis meridionalium et occidentalium rarum incolis accusandae, qui omnibus vestimentis immo tectis orbat, per diu gravissimos labores in summo solis ardore perpassi, oculos sudore, arena et noxis scatentes gerunt et impletos, noctesque frigidas sub coelo degere consueverunt; nec mirum ideo apud hos per totum fere annum blennorrhoearum epidemias non desiderari.

Refrigerium frigidis noctibus provocatum, Gallorum exercitui in Aegypto
 insanti tot damna attulit et perniciem; nec minus annis MDCCCXIII, XIV et
 W, nostros milites, qui post summas virium intentiones frigidas noctes in cam-
 persaepe degerunt, in vehementissimas blennorrhoeas induxit.

Simplicem et alias plane innoxiam ophthalmiam, refrigerio influente, in
 blennorrhoeam commutari posse, fere quotidie observare licet. Moguntiaenum in-
 et Coloniae endemicae blennorrhoeae catarrhalibus aut catarrhali-rheumaticis
 ophthalmiis plerumque originem debent. Praedisponentem causam plethora abdo-
 minalis his exhibet, occasionalem venti perflantes, quibus montana hujus regio
 litora, et praesertim vallecule majorem et stricte sic dictam Rheni vallem
 metraentia simul cum fluminis impetu et velocitate valde favent, ita ut catar-
 rhus et rheumatismus his regionibus inhaerentes plurimis morbis accedant.

Refrigerium non solum frigido tempore, verum potissimum calore ali, ideo-
 ne per aestatem et in meridionalibus terris longe frequentius et vehementius
 currere hic addere vix necesse est. In nostris etiam regionibus, novissimae
 states aridiores blennorrhoeis fere abundabant.

Metastases et metasehematismos morborum, in mucosis membranis depo-
 sitos, profluvia sequi possunt, nec raro otorrhoea, leucorrhoea suppressis exan-
 thematibus serophulosis, herpeti, aliis succedere videmus. Eadem ratione oculo-
 rum blennorrhoeae, persaepe exanthemata repulsa, aut profluvia ex aliis partibus
 oppressa accusant. Otorrhoea, leucorrhoea, gonorrhoea aliae, proclivis oculis,
 blennorrhoeis compensantur quae eo majori vehementia deerrunt, quo magis
 vali ad eas omnino propensi erant.

Sat momentosa occasionalis causa memoranda restat, quam ophthalmiae
 catarrhales, serophulosae et arthriticae, conjunctivam, tanquam mucosam, sedem
 agentes largiuntur. Oculi, quo opportuniore sunt, eo citius in blennor-
 rhoeam inducuntur. Similia in aliis corporis partibus observantur. Otitis non
 raro in otorrhoeam; catarrhus pulmonum in phthisin pituitosam, arthritica ure-
 tritis in gonorrhoeam finiuntur. Catarrhales ophthalmiae prae ceteris in culpa

sunt, nec infitandum novissimis annis ad blennorrhoeas citandas in dies eas pro-
pensione factas esse.

Miasmata et contagia non omittenda, quippe quae, ubicunque epidemic
grassantur blennorrhoeae, inter occasionalia primas agunt, et pluribus simul labo-
rantibus celerrime nata, affines et curatores aegrotorum in valetudinario versan-
tes, praedispositione praeditos eodem morbo infestant, praesertim si spongiarum
et linteorum ad oculos lavandos usus communis erat et familiaris. Parvula
blennorrhoearum epidemias inter pauperes nostros saepius grassari vidi, qui fre-
quenti numero in angustis domiciliis versati, nec satis attenti iisdem linteamini-
bus ad faciem mundandam omnes usi ab uno aegrotante morbum acquirunt, et
causa quam hic accusat, cum ceteris non communicata erat.

In orphanotropheis inter infantes in uno cubiculo conviventes celerrime
propagari videmus blennorrhoeas, ceteris aliorum ordinum, nisi magnus inter om-
nes est convictus, liberis et intactis relictis. Simulac vero nonnulli in conclavi-
antea non infecto degentes aegrotare coeperunt, totus eorum ordo mox corrip-
tur, quod contagio tantum aut miasmate usu quotidiano et convictu natis expe-
nere licet.

Eaedem fere observationes in exercitibus, qui saepius blennorrhoeis su-
enberunt, factae sunt. Si milites in domiciliis conjunctis collocati erant, et non
nulli eorum in blennorrhoeam inciderant, ceteris in eodem domo versantibus ne-
corruptis, inter eidem ordini cum aegrotis addictos epidemia fere exoriebatur.
Quotidianus convictus nec evitabilis earundem rerum ad corpus mundandum
necessariarum usus his in casibus summas egit, cum alia munera nunquam mi-
tos tam arte conferat, ut contagium communicari possit. Idcirco milites dispe-
sisse, singulosque privatis in domicilia tradidisse, ad blennorrhoeas arcendas u-
lissimum erat.

Etiam in locis valde angustis, ubi complures, varii gradus blennorrhoe-
laborantes versantur, contagium alitur, unde non solum jam praesentis mor-
incrementum exoriri, verum etiam quisque praedispositione praeditus, protin-

perripi potest. Omnibus oculorum blennorrhoeis, causae et indoles sint diversis-
rae, contagio nato amplius se propagandi vis inhaeret.

Neonatorum blennorrhoea tam vehemens hac ratione et contagiosa est, ut
eum adultos in summam perniciem adducat, si ex infantis oculo pituitae aliquid
eum oculis immisum est. Permultas novi, qui alterius oculi perniciem querun-
t, quod iisdem spongiis, quibus infantulorum aegros oculos laverant, nil curan-
t, ad proprios mundandos usae erant. Obstetrix nostrae urbis, vehementissima
blennorrhoea exorta oculum perdidit, postquam pituitam blennorrhoeicam ex in-
fantis oculo desumptam proprio admovit, rem plane innoxiam gloriata. Ante hos
nonnullos annos curatrici in caritatis nosocomio accidit, ut sponsia, qua
illi infantis ophthalmia neonatorum correpti loti erant, aquae frigidae antea
versa propriis oculis lotis, jam eodem vespere in vehementissimam incideret
blennorrhoeam, quae altero oculo jam postridie pessundato, alteri eo tantum pe-
ccavit, ut pupilla artificiali a me formata, mulier curatricis munus, quo etiam
nec fungitur, denuo suscipere posset.

Puellis vermibus aut scrophulosis laborantibus leucorrhea interdum citatur,
cuius secretum ex vagina oculis admotum blennorrhoeam progenuisse haud raro
conservare mihi licuit, nec multum tempus praeterlapsum cum tota familia ex
talem hominibus constans, a tali infantulo infecta in summum periculum incide-
re. Gonorrhoeicis blennorrhoeis vehementissimum inhaeret contagium quod mor-
bus ab alio ad alium celeri impetu propellere haud raro observavi.

Eae etiam blennorrhoeae, quae catarrhalibus, aut catarrhali-rheumaticis
ophthalmiis ortae sunt, pituita sano oculo communicata, novas excitare possunt.
Attamen ejusmodi-exempla inter pauperes nostros occurrunt, quae haud exig-
uus medici laborem, ut debellentur sibi expostulant.

Idem ad scrophulosam, arthriticam et aegyptiacam blennorrhoeam confe-
rum est.

Contagium pituitae tantum inhaerens, neque omnino ut multi false conten-
t, de morbi causis dependens, secreti qualitate, morbi stadio et symptoma-
rum vehementia varie mutatur.

Quod ad secreti naturam pertinet, quo magis puris colorem et consistantiam imitatur, eo majorem inficiendi offert vim, ita ut vel exigua copia in sanum oculum translatum, fere semper blennorrhoeam provocet, et raro oculi tam turgidi reperiantur, qui ei resistere possint. Sin vero a pure recedens pituita, multa lacrima mista aquosa et mitis facta est, minorem vim offert, et sanis oculis fere integris relictis, irritatis tantum et ad blennorrhoeam proclivis nocet. Tenui nique et lacrimas turbidis floccis mixtas continenti secreto contagiosa vis fere deest, praesertim si blennorrhoea inflammatoriis signis non stipata est, eorum oculi tantum insolita opportunitate praediti succumbent.

Secundum morbi stadia eo mutatur contagii vis, ut maxima sit in pyorrhoeico, minor in phlegmatorrhoico, fere nulla et oculos tantum valde proclivis et irritatos infestans in hydorrhoeico.

Quo vehementiora symptomata blennorrhoeam stipant, et quo acutior decursus, eo facilius contagium oritur. Chronicae nec gravioribus signis coartatae blennorrhoeae raro et irritatos tantum oculos inficiunt. Si usque ad conjunctivae plicas recessit papillatum corpus, pituitam lacrima multa mistam demittens, vix et ne vix quidem contagium inde progigni potest.

Quibus expositis, facile intelligendum erit, catarrhalem aut neonatorum blennorrhoeam, si in pyorrhoeico stadio versetur, longe magis tinendam esse quam aegyptiacam aut gonorrhoeicam, si aquosum aut pituitosum demittunt ocreta.

Falluntur qui credant, nonnullarum blennorrhoearum contagium, aereum quod excurrat rebus anorganicis inhaerere posse.

Si complures blennorrhoea aliqua correpti in angusto, luci et aeris perpetui non satis exposito loco degunt, praesertim si morbus majorem gradum attulerit, miasma facile progignitur, quo aegroti non solum in pejus vertuntur, sed etiam sani opportunitate praediti in morbum prorumpi possunt. Quae nomenclatura blennorrhoearum divulgatio certa aeris constitutione, magno calore et tempestatibus valde adjuvatur. In orphauotropheis expositorum infantum ha-

et militum domiciliis, si blennorrhoeae grassantur, miasma valde respiciendum est. Aerem enim omnino in ejusmodi aedificiis oculis damnum afferre con-
 tili non potest, cum saepius et diversis locis aegros ejusmodi, ex cubiculis,
 cum pluribus oculis laborantibus degebant, in valetudinaria aliis aegrotis des-
 ta missos etsi in illis etiam non optima erat aeris ratio sanescere, simulac
 in primum conclave redierant, in pejus denuo converti observaverim.

DE OCULI BLENNORRHOEARUM DECURSU ET EXITU.

Decursus blennorrhoearum modo rapidus modo segnis, causis, organis si-
 affectis, aegroti constitutione et ad morbum proclivitate, multis aliis rebus
 mutatur. Si in homines sanos et robustos nec ad profluvia mucosa opportu-
 nitate praeditos, causis in unum tantum influentibus provocatae illabuntur, nec
 contagione nec symptomatum vehementia modum excedunt, postquam acmen
 gerunt simul cum inflammatoriis signis sensim evanescunt, et papillato cor-
 nio regresso conjunctiva mox induit formam propriam et naturalem. Si fauste
 succedit, intra tres aut sex hebdomades morbus decursum explet, relictæ qua-
 litate oculorum irritabilitate quae per longum tempus summam curam et cautelan
 expostulat.

At omnibus blennorrhoeis magna in chronicum statum transeundi insita
 proclivitas, quae omnes majorem gradum assecutas fere incredibili pertinacia
 immenses immo annos protrahit. Quod si accidit, inflammatoria signa rece-
 dunt, saepe etiam tam exigua pituitae secretio adest, ut minus peritus morbum
 esse sublatum facile credat. At hic recessit tantum paulisper, nec fugient ac-
 tius inquirentem, papillae in conjunctivae plicis relictæ, quae nondum sana-
 oculum sat luculenter manifestant, palpebras, rima coarctata, expedite tollere
 propterea non licet, oculi celeriter languent et rubent, aerem ejusque mutationes
 ferunt, caligant usque, gravedinis sensum cient et mane ad internos angulos

pituitam accumulata offerant. Omnia haec, chronica blennorrhoea nituntur, cum plerique veram naturam accuratius tantum inquirens medicus detegat, cum plerique aegri nil accusent nisi magnam visus imbecillitatem. Saepius me consuluerunt hac sic dicta oculorum debilitate affecti, adulti aequae ac qui infantes per longius brevius tempus remidiis irritantibus, spirituosius praesertim et aromaticis temporum frontique admotis fronticationibus, sale ammoniaco volatili aliis frustra curati chronica blennorrhoea a medicis haud cognita, laborabant. Jam celeb. Walther in commentario de contagiosa ophthalmia ad Rhenum inferiorem grassante (Ephemeridum a Græfe et Walther editarum Vol. II. p. 56.) conscripto de huiusmodi visus imbecillitate disserte locutus est.

Non aequalis semper blennorrhoearum decursus, modo enim exacerbantur modo remittuntur, nec raro veras earum intermissiones, typum regularem sequentes observare licet. In chronicis blennorrhoeis exacerbationes saepe occurrunt nec raro aeris mutationibus nituntur. Nimbi, tonitrua et dirae procellae iis valde favent, et saepe in hominibus qui exceptis nonnullis in conjunctivae plicis relictis granulationibus malo se abdicaverant recidivos provocant; quod false inducit medicos, ut climatis et aeris mutationibus provocari censerent blennorrhoeas.

Alii etiam morbi blennorrhoearum decursum commutare possunt. Sic exanthemata recedere videmus, diarrhoea exorta; nec raro typho grassante plaue tolluntur. Idem de exanthematibus chronicis et acutis dicendum. Si herpes, scabies, scarlatina, morbilli alia aegrotum invasere, oculi saepe sanantur, saepe etiam si exanthemate denuo aegrotare incipiunt. Non multum ante puellam, scarlatina lacrimonalis blennorrhoea laborantem curavi, quae scarlatina orta blennorrhoea laborabatur, neque in eam recidit, priusquam exanthema plane evanisset.

Exitus blennorrhoearum varius est, sive enim resolvuntur, sive in ulcerationem, exsudationem, hypertrophiam aut ectasin transeunt.

Ubi primum resolvi coeperunt, quod aegrotis faustissimum, aequali eundem omnia symptomata remittuntur; papillae vasis tenuibus cedunt, et conjunctivae mucosae membranae facultate deposita, simul cum serosa et propria natura, &c.

et nitentem denuo induit superficiem. Quod vero ut fieri possit, epithelium sane integrum remanserit necesse est; quo laeso restitutio conjunctivae frustra spectabitur.

Una cum inflammatoriis signis, rubore, tumore, dolore et caloris sensu, secreti copia minuitur, ejusque natura, quo magis papillae decrevere, mitiorem praebet et benigniorem. Insolita tantum conjunctivae relaxatio, venarum opacitas et adaucta ex Maibomianis glandulis et cryptis sebaceis secretio relinquunt oculi lucem et temperaturae mutationes aegrius ferunt, usu celeriter languent assentur, et per longius temporis spatium eorum quaedam percipi solet imbecillitas.

In ulcerationem blennorrhoeae saepe excedunt, praesertim si graviora stadia assecutae erant. Ulcera, secreto acri et corrodente potissimum provocata, corneam plerumque occupant et celeri impetu magnum ambitum acquirunt. Quo magis pus pituita initatur, et diutius in oculo retinetur, eo majus ulcerum periculum minitabitur^{*)}. Primo cornea turbida, conjunctiva ejus scabra, relaxata tanquam acri corrosa apparet, tum locus quasi impressus conspicitur, unde ambitu et altitudine indies crescens ulcus initium desumit. In blennorrhocis complicatis, ubi sclerotica, cellulosa, aliae partes simul laborant, phlyctae nis abscessibus formatis, ulceratio vehementior etiam fit, et longe periculosissimam^{**)}.

Ulcerationem imminere tum imprimis suspicandum est, cum conjunctiva, corvillum instar circa corneam elata, pituitae effluxum retinet. Ulcera aut cicatrices crassas, cellulosas, et leucomata aut cornea perfossa, adhaesiones intra corneam et corneam, iridocelen, keratocelen, staphyloma, nec raro etiam cataracta centralem aut totalem relinquunt.

In suppurationem blennorrhoeae raro finiuntur. Quae refrigerio ortae aut rheumatismo complicatae, cellulosa, fibrosa et interne sitas serosas oculi

^{*)} Conferas p. 6.

^{**)} Conferas p. 16.

membranas simul corripuerant, puris formationem interdum secum ducunt. Per modo in corneae cellulosa formatum, abscessum ciet, qui celeriter apertus, ulcus constituit, modo sub hypopii veri forma veloci impetu bulbum destruit.

Cum vera suppuratione, stadium pyorrhoeicum non commutandum est, quod multos scriptores induxit, ut ophthalmiam purulentam nuncuparent.

Si blennorrhoeae eo exultae erant, ut interne sitas serosas membranas praesertim Descemetii, in inflammationem inducerent, aut jam ab initio serosae membranae simul laboraverant, lymphaticae quoque exsudationes succedere possunt, unde nubeculae in pupilla et membrana capsulari anteriore, coalitum inter uvam et capsulam lentis, cataractam capsularem centralem et cataractam completam oriri debemus. Cataractae centrales neonatorum blennorrhoeae ut plurimum originem debent.

Hypertrophia cellulosae et vasorum, blennorrhoeas saepe insequuntur. Illa conjunctivae propria, a plicis ejus epithelio destructo ad palpebras progreditur, eo interdum increscit, ut palpebris intumefactis et a situ naturali remotis eorum primum constituatur. Conjunctiva in his casibus tanquam carne luxuriante impletur, apparet, et palpebrae inversae, tumoribus e fusco rubris similes, tetram aegri faciem et difformem reddunt. Interdum etiam adhaesionibus intra bulbi et palpebrarum conjunctivam immo intra ipsas palpebras exortis, anchylo- et symblepharon progignitur.

In corneae etiam cellulosa, hypertrophia existere potest, cui staphylo-ma pellucidum originem debet. Hoc non raro fit in iis blennorrhoeis, quae summum acumen assecutae, corneae conjunctivam morbosam reddiderunt.

Vasorum hypertrophiae in corneae conjunctiva parum provocant, qui hominibus scrophulosi, aut nimia abdominali plethora saepe observatus, pericissimum se praebet et raro plane oboletur.

Blennorrhoeae, quae ab initio statim, aut in decursu, chorioidaeam et corpus ciliare infestaverant, corporis ciliaris et scleroticae staphylomata relinquunt.